

INFECCIÓN POR HANTAVIRUS: SE PUEDE PREVENIR



El Hanta es adquirido al inhalar el virus contenido en las deposiciones u orina del ratón de cola larga infectado. El mayor riesgo de contagio ocurre en casas o cabañas rurales cerradas por mucho tiempo y permanecer o circular en lugares campestres con malezas o malas condiciones higiénicas.


La mayor cantidad de contagios ocurren en época de verano entre los meses de Diciembre a Marzo. Puede llegar a ser una enfermedad muy grave o mortal, sin embargo se puede prevenir.

CONTAGIO HANTAVIRUS

2. LAS HEGES INFERIDAS SECAS,
CONTENIDAS EN EL POLVO, SE
TRANSPORTAN POR EL AIRE.



3. INHALACIÓN DE HEGES POR
EL SER HUMANO.



1. EL VIRUS ESTÁ CONTENIDO EN LAS
HEGES DE LOS ROEDORES.

4. SÍNTOMAS: DOLORS MUSCULARES,
FIEBRE, TOS, DOLOR DE CABEZA,
MALESIR RESPIRATORIO AGUDO

El ratón de cola larga es aquel que su cola mide aproximadamente dos veces el largo de su cuerpo.



¿Cómo prevenir el contagio por Hanta?

1. Si va de paseo a lugares rurales, prefiera sitios autorizados, desmalezados a los que llegue luz solar y con adecuada disposición de basuras.
2. Evite el acceso de roedores a lugares habitados.
3. Si ingresa a un lugar deshabitado, póngase guantes y mascarilla común. Abra todas las puertas y ventanas, salga del recinto por media hora. De esta forma la luz solar inactiva el virus.
4. Limpie superficies con solución de agua con cloro. Evite barrer o aspirar.
5. Si encuentra un roedor muerto no lo manipule. Rocíe con cloro directamente luego tome con guantes y ponga en una bolsa plástica y deseché o entierre a una profundidad de 20 – 30 cm.
6. Mantenga alimentos en recipientes cerrados.
7. Mantenga el aseo y orden.
8. Mantenga desmalezado alrededor de viviendas.
9. Almacene leña ordenada y a una altura mínima de 30 cm.



SI HA ESTADO EN UN LUGAR DE RIESGO LOS ÚLTIMOS 45
DÍAS Y PRESENTA FIEBRE ALTA, DOLORS MUSCULARES,
DEBILIDAD, DOLOR DE CABEZA, VOMITOS, DIARREA Y
TOS O DIFICULTAD RESPIRATORIA .
¡CONSULTE EN LA URGENCIA MAS CERCANA!

